

IMCIVREE® 10 mg/ml Injektionslösung. **Wirkstoff:** Setmelanotid.

Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält 10 mg Setmelanotid in 1 ml Injektionslösung. **Sonst. Bestandt.:** N-(Carbonyl-methoxypolyethylenglykol 2000)-1,2-di-stearoyl-glycero-3-phosphoethanolamin-Natriumsalz (mPEG-2000-DSPE), Carmellose-Natrium (Ph.Eur.), Mannitol (Ph.Eur.) (E 421), Phenol, 10 mg/ml Benzylalkohol, Natriumedetat (Ph.Eur.), Wasser für Injektionszwecke.

Anwendungsgebiete: Behandlung von Adipositas u. zur Kontrolle d. Hungergefühls im Zusammenh. mit erworbener hypothalamischer Adipositas (eHA) aufgrund einer Schädigung od. Funktionsstörung d. Hypothalamus bei Erw. u. Kdrn. ab 4 J.

Behandlung von Adipositas u. zur Kontrolle d. Hungergefühls im Zusammenh. mit genetisch bestätigtem Bardet-Biedl-Syndrom (BBS) bei Erw. u. Kdrn. ab 2 J.

Behandlung von Adipositas u. zur Kontrolle d. Hungergefühls im Zusammenh. mit genetisch bestätigtem, durch Funktionsverlustmutationen bedingtem biallelischem Proopiomelanocortin (POMC)-Mangel (einschließl. PCSK1) od. biallelischem Leptinrezeptor(LEPR)-Mangel bei Erw. u. Kdrn. ab 2 J.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichk. gegen d. Wirkstoff od. einen d. sonst. Bestandt.

Name und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers: Rhythm Pharmaceuticals Netherlands B.V., Radarweg 29, 1043NX Amsterdam, Niederlande.

Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: Rezept- und, apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten (eingeschränkte ärztliche Verschreibung gem.

Abschnitt 4.2 der Fachinformation).

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiadiposita, exkl. Diätetika, zentral wirkende Antiadiposita, ATC-Code: A08AA12.

Weitere Informationen zu besonderen Warnhinweisen und

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.

Stand der Information: 04/2026

Rhythm-AT v5.0 04/2026